Revue mensuelle - 2020 - volume 139

TIRÉ À PART

Revue de la Faculté de médecine et de médecine dentaire de l'UCLouvain



QUE RETENIR DES RECOMMANDATIONS DE LA SOCIÉTÉ
EUROPÉENNE DE CARDIOLOGIE ET DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
D'ATHÉROSCLÉROSE (2019) SUR LE TRAITEMENT DES DYSLIPIDÉMIES
POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES ?

Olivier S. Descamps, Johan De Sutter, Ann Mertens, Caroline Wallemacq, Michel Langlois, Ann Verhaegen, Ernst Rietzschel, Guy De Backer







Que retenir des recommandations de la Société Européenne de Cardiologie et de la Société Européenne d'Athérosclérose (2019) sur le traitement des dyslipidémies pour la prévention des maladies cardiovasculaires?*

Olivier S. Descamps¹, Johan De Sutter², Ann Mertens³, Caroline Wallemacq⁴, Michel Langlois⁵, Ann Verhaegen⁶, Ernst Rietzschel⁷, Guy De Backer⁸

What should be taken into account from the 2019 recommendations of the European Atherosclerosis Society and European Society of Cardiology concerning dyslipidemia management for preventing atherosclerotic cardiovascular disease?

Several members of the Belgian Societies of Atherosclerosis and Cardiology have revisited in the form of 10 questions the main points of the new recommendations of the European Atherosclerosis Society (EAS) and European Society of Cardiology (ESC) concerning dyslipidemia management for preventing atherosclerotic cardiovascular disease (AVD). These new guidelines are underpinned by a number of key concepts, including the certainty that LDL cholesterol is the major cause underlying the development of atherosclerosis, that reducing LDL cholesterol helps diminish cardiovascular risk, that this cardiovascular benefit is the same regardless of how this reduction is met (nutrition, statin, ezetimibe, or PCSK9 inhibitor), and that there is neither a lower limit to this effect nor any danger at all of extremely low LDL cholesterol levels. To effectively put this knowledge into practice, a step-by-step approach is recommended; thereby enabling us to weight the intensity of the preventive approach based on individuals' overall MCVA risk and their baseline (untreated) LDL-C levels.

KEY WORDS

Cardiovascular prevention, risk factor, cholesterol, diabetes, statin

Les membres de la Société Belge d'Athérosclérose et de Cardiologie ont revisité en 10 questions les points principaux des nouvelles recommandations de la Société Européenne d'Athérosclérose (EAS) et de Cardiologie (ESC) en matière de traitement des dyslipidémies pour la prévention des Maladies Cardio-Vasculaires Athérosclérotiques (MCVA). Ces nouvelles lignes directrices sont sous-tendues par un certain nombre de concepts-clés parmi lesquels la certitude que le cholestérol LDL est une des causes du développement de l'athérosclérose, que la réduction du cholestérol LDL permet de réduire le risque cardiovasculaire, que ce bénéfice cardiovasculaire est le même quelle que soit la manière dont cette réduction est obtenue (nutrition, statine, ézétimibe, inhibiteur du PCSK9, ...) et qu'il n'y a pas de limite inférieure à cet effet et pas de danger aux taux extrêmement bas de cholestérol LDL.

Avec le soutien de : Jean-Luc Balligand (CU Saint-Luc, Bxl), Cristiana Banu (CHL, Luxembourg, presidente de la société luxembourgeoise de cardiologie), Christophe Beauloye (CU Saint-Luc, Bxl), Antoine Bondue (Hôpital Erasme, Bxl, président du comité scientifique de la Ligue Cardiologique Belge), Samuel Bruno (CHWAPI, Tournai), Stéphane Carlier (CHU Ambroise Paré, Mons), Fabian Chenot (GHDC, Charleroi), Patrick Chenu (CU Saint-Luc, Bxl), Agnesca Ciarka (Bruxelles & UZ Leuven), Antoine De Meester (CH Jolimont, La Louvière), Fabien Demeure (CU Montgodinne, représentant du Young Cardiologists Club de la BSC), Hubert Dereppe (CHWAPI, Tournai), Martine Dethy (Medimarien, Bruxelles), Cécile Goffinet (Clinique Saint Jean, Bxl), Michel Guillaume (CHU Charleroi), Michel Hermans (CU Saint-Luc, Bxl), Etienne Hoffer (CHR de la Citadelle, Liège), Raymond Kacenelenbogen (CHU Saint-Pierre, Bruxelles), Patrizio Lancellotti (CHU Liège Président de la BLC), Attilio Léone (CHU Tivoli, La Louvière), Pascal Lefèbvre (CHU Charleroi), Fabienne Liénard (CHU Tivoli, La Louvière), Meta-Celestine Mbuyamba (CHR Citadelle, Liège), Nicolas Paquot (CHU de Liège), Daniela Pencu (GHDC, Charleroi), Alexandre Persu (CU Saint-Luc, Bxl), Philippe Van de Born (Hôpital Erasme, Bxl), Alina Vlase (CHWAPI, Tournai)

INTRODUCTION

En 2019, de nouvelles recommandations ont été formulées sur le traitement des dyslipidémies pour la prévention des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques (MCVA) par un groupe de travail de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) et de la Société Européenne d'Athérosclérose (EAS). Ce document assez long (78 pages) est disponible (1) ainsi que sa version de poche (www.escardio.org/guidelines).

La Société Belge d'Athérosclérose a fait une sélection de ce qui est important pour la pratique quotidienne. Les recommandations de classe I sont basées sur des preuves et/ou un consensus sur lesquels tout le monde est d'accord; les recommandations de classe II sont plus controversées et sont divisées en Ila où les preuves et/ou consensus sont en faveur de l'utilité et l'efficacité alors qu'en classe IIb il y a moins de preuves et/ou de consensus.

Le traitement des dyslipidémies pour la prévention des MCVA est basé principalement sur une réduction des taux sanguins des lipoprotéines de basse densité (LDL) qui peut être estimée en mesurant le taux de cholestérol de ces LDL: le taux de cholestérol LDL (LDL-C). Le lien entre LDL et MCVA est maintenant clairement considéré comme causal (2) et les nombreuses études d'intervention randomisées et contrôlées ont démontré qu'une réduction de LDL-C s'accompagne d'une prévention des MCVA avec comme règle de base que chaque réduction additionnelle de 40 mg/dL entraîne une réduction de 20 % des MCVA (3).

Afin de mettre ces connaissances en pratique de manière efficace, une approche étape par étape est recommandée pour pondérer l'intensité de l'approche préventive en fonction du risque global de MCVA d'un individu et de son taux de base (non traité) de LDL-C.

Nous abordons dans ce document certaines des questions qui peuvent se poser dans la pratique quotidienne.

OUI EST ÉLIGIBLE À UNE PRÉVENTION DE MCVA?

En principe, tout le monde mais, dans la pratique, l'approche individuelle dépendra du risque global de MCVA et du taux de base (non traité) de LDL-C.En évaluant le risque global, la population sera divisée en quatre « catégories » de risque global comme cela est indiqué à la figure 1, risque « très élevé », « élevé », « modéré » et « faible ».

Pour les personnes sans MCVA, diabète, insuffisance rénale ou sans valeur extrême de facteur de risque, il est recommandé d'estimer le risque global cardiovasculaire (CV) grâce au modèle SCORE; ce dernier est recommandé parce que ce modèle peut être recalibré dans chaque pays en tenant compte des données nationales. Cela a été réalisé pour la Belgique (4) comme il est présenté dans la figure 2. Dans les directives ESC/EAS de 2019, il est également recommandé de tenir compte d'autres facteurs qui ne sont pas inclus dans le modèle (le tableau 1 montre de tels facteurs), mais qui peuvent nuancer l'évaluation du risque CV total. D'autres para-

mètres lipidiques tels que le cholestérol HDL (HDL-C), les triglycérides (TG) et la Lipoprotéine(a) (Lp(a)) influencent aussi le risque CV total. Il est également recommandé de rechercher la présence d'athérosclérose subclinique chez les personnes à risque modéré à l'aide d'une tomodensitométrie cardiaque (coroscanner ou score calcique) et/ou d'une échographie carotidienne; ce résultat peut entraîner un reclassement du risque modéré vers faible ou élevé selon les résultats et donc avec des conséquences sur la prévention (Tableau 1).

La figure 2 montre comment estimer le risque de MCVA à partir du modèle SCORE pour la Belgique suivant les taux de HDL-C et la présence d'antécédents familiaux de MCVA prématurées (5).

CHEZ QUEL PATIENT FAUT-IL MAXIMALISER L'APPROCHE PRÉVENTIVE ?

Les patients que l'on identifie dans la catégorie à « risque élevé » ou à « risque très élevé ».

Ces patients sont identifiables par leur histoire clinique (Figure 1).

Un patient est dit à « **risque très élevé** » lorsqu'il présente une des situations cliniques suivantes :

- des antécédents de maladies cardiovasculaires ;
- une insuffisance rénale sévère (eGFR < 30 mL/ min/1.73m²);
- un diabète compliqué d'une atteinte d'au moins un organe-cible ou associé à ≥ 3 facteurs de risque majeurs ou un diabète de type 1 de durée supérieure à 20 ans ;
- une hypercholestérolémie familiale compliquée de MCVA ou associée à ≥ 1 autre facteur de risque majeur;
- le patient chez qui la charte SCORE estime un risque de mortalité cardiovasculaire d'au moins 10 % à 10 ans (Figure 2).

Un patient est à « **risque élevé** » lorsqu'il présente une des situations cliniques suivantes :


- une insuffisance rénale modérée (eGFR 30-59 ml/ min/1.73m²);
- un diabète sans atteinte d'organe-cible, de durée supérieure à 10 ans ou associé à ≥ 1 facteur de risque;
- une hypercholestérolémie familiale sans autre facteur de risque ;
- un facteur de risque isolé mais fortement élevé comme une pression artérielle > 180/110 mmHg, un taux de cholestérol total > 310 mg/dL ou de LDL-C > 190mg/dL;
- le patient chez qui la charte de SCORE estime un risque de mortalité cardiovasculaire entre ≥ 5 et <10 % à 10 ans (Figure 2).

FIGURE 1. Algorithme de prévention cardiovasculaire avec ses trois étapes

EVALUATION DES RISQUES		TRÈS HAUT RISQUE	HAUT RISQUE	RISQUE MODERE	RISQUE
Historique cardio-vasculaire	MCVA (clinique/imagerie)	erie)			
Diabète	 Atteinte d'organe (microalbun ou neuropathie) ≥ 3 facteurs de risque majeurs DT1 depuis > 20 ans 	Atteinte d'organe (microalbuminurie, rétinopathie ou neuropathie) 2 3 facteurs de risque majeurs DT1 depuis > 20 ans	Sans atteinte d'organe mais avec • ≥ 1 facteur de risque ou • Depuis ≥ 10 ans (DT1 ou DT2)	Patients jeunes • DT1 < 35 ans • DT2 < 50 ans avec durée du diabète de moins de 10 ans sans autre facteur de risque	
Fonction rénale	eGFR < 30 mL/min/1,73m ²	73m²	eGFR 30 – 59 mL/min/1,73m²		
Facteur hérité	HF & MCVA ou un au	HF & MCVA ou un autre facteur de risque majeur	HF sans autre facteur de risque majeur		٠
Facteur de risque isolé			• PA > 180/110 mmHg • CT > 310 mg/dl • LDL-C > 190 mg/dl		
SCORE		> 10%	≥ 5 % et < 10 %	≥ 1 % et < 5 %	<1%
		>	>	>	>
D-1G1	< 40 mg/dL* Classe IIb	< 55 mg/dl. ET ≥ 50 % réduction* Classe I	< 70 mg/dL ET > 50 % réduction* Classe I	< 100 mg/dL Classe IIa	< 116 mg/dL Classe IIb
Non-HDL-C	Non-HDL-C < 85 mg/dL	0	< 100 mg/dL < 130 mg/dL	< 130 mg/dL	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ApoB		< 65 mg/dL	Nam 08 >	< 100 mg/dL	_)
	Ī				
Intervention MCVA: Maladie Cardiovasculaire At	1. Changement de mode de vie ET statine de haute intensité 2. ÉZETIMIBE 3. Inhibiteur PCSK9 Les taux de lipides doivent être ré taux de lipides doivent être ré semaines après [e SCA, semaines après e SCA, semaines e sem	 Changement de mode de vie ET statine de haute intensité ÉZETIMIBE Inhibiteur PCSK9 Les tava de lipides doivent être réévalués 4 à 6 Senpaines agrès e SCA, que/* par rapport à la valeur non traitée/ PA: Pression Artérielle/CT: Ct 	1. Changement de mode de vie ET statine de haute intensité 2. Statine de haute intensité 3. EZETIMIBE 3. Inhibiteur PCSK9 Les taux de lipides doivent être réévalués 4 à 6 Semaines après [e SCA. Sem	 Changement de mode de vie Statine Statine Hypercholestérolémie Familiale/ SCA: Syndrome Corona 	Conseils sur le mode de vie mode de vie arien Aigu; °: voir texte

Que retenir des recommandations de la Société Européenne de Cardiologie et de la Société Européenne d'Athérosclérose (2019) sur le traitement des dyslipidémies pour la prévention des maladies cardiovasculaires ?

FIGURE 2. La charte SCORE



L'estimation du risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans peut être calculée en classant le patient dans ce tableau en fonction de la présence de facteurs classiques de risque (âge, sexe, tabagisme, pression artérielle systolique, cholestérol total) et peut être encore nuancée ensuite en multipliant ce pourcentage de risque par un facteur de multiplication donné en fonction du taux de cholestérol HDL et de la présence d'antécédents familiaux de MCVA prématurées.

TABLEAU 1. Facteurs qui peuvent nuancer le risque SCORE

- Précarité (origine de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire)
- Trecante (origine de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire)
- Obésité et obésité centrale mesurée par l'IMC et la circonférence abdominale
- Sédentarité
- Stress psychosocial (incluant le burn-out)
- Histoire familiale de MCVA prématurées (homme < 55 ans ; femme < 60 ans)
- Désordres psychiatriques majeurs
- Maladie inflammatoire chronique auto-immune
- Traitement pour le SIDA
- Syndrome d'apnée du sommeil
- Fibrillation auriculaire; Hypertrophie ventriculaire gauche; Stéatose hépatique non alcoolique
- Maladie rénale chronique

FAUT-IL SE DÉSINTÉRESSER DU PATIENT À RISOUE BAS ET MODÉRÉ ?

Non! Chez ceux-ci, les recommandations nous encouragent à contextualiser et à repérer ainsi les plus critiques, c'est-à-dire ceux qui risquent de se retrouver dans la catégorie à « risque élevé » ou à « risque très élevé » dans un futur proche ou qui pourraient être assimilés à ces catégories par la présence d'autres facteurs de risques (facteurs « modificateurs ») (voir Tableau 1).

Chez les jeunes patients à « risque bas » et à « risque modéré », le médecin peut s'aider de la charte par une simple extrapolation à un âge plus élevé. L'illustration de cette extrapolation permettra aux patients de comprendre la nécessité d'adapter leur mode de vie afin de leur éviter d'arriver dans la zone rouge/rouge foncé quand ils seront plus vieux.

Les conseils diététiques doivent être appliqués dans toutes les catégories de risque y compris dans les catégories de « risque faible » et de « risque modéré ». C'est un des changements importants dans ces nouvelles recommandations, puisqu'elles veulent donner une place plus prioritaire à l'équilibre diététique, au point d'ailleurs qu'elles ont fixé, pour les patients à « faible risque », la nécessité d'essayer d'atteindre un taux de cholestérol LDL inférieur à 116 mg/dL par une adaptation du régime alimentaire.

QUELS OBJECTIFS DE LDL-C FAUT-IL ATTEINDRE EN FONCTION DU RISQUE GLOBAL DE MCVA ET POURQUOI A-T-ON ABAISSÉ DE NOUVEAU LES CIBLES PAR RAPPORT AUX RECOMMANDATIONS PRÉCÉDENTES?

Les valeurs cibles pour le LDL-C sont décidées en fonction de la catégorie de risque CV total, comme présentées à la figure 1. Ces valeurs cibles de LDL-C ont récemment été ajustées sur la base d'une synthèse critique de l'évidence scientifique dont on dispose ; la classe de recommandations est présentée à la figure 1 pour chaque catégorie de risque.

Ainsi, les nouvelles recommandations sont caractérisées par un abaissement important des cibles thérapeutiques du LDL-C et la nécessité de réduire d'au moins de 50 % le taux de LDL-C chez les patients à « risque élevé » et « risque très élevé ». Chez ces derniers patients, le principe est « the lowest is the best », c'est-à-dire réduire le LDL-C au maximum de nos possibilités et de la tolérance. Les cibles sont justifiées par le fait que l'on a démontré qu'une diminution du LDL-C en dessous de 70 mg/dL permettait une régression des plaques d'athérome et que chez les patients avec des antécédents cardiovasculaires, c'est cette régression des plaques qui permettait une prévention CV efficace.

Il est vrai que chaque nouvelle directive nous demande de reculer les cibles de LDL-C vers des taux de plus en plus bas. Ceci n'a rien d'étonnant, ni d'inquiétant, ni de commandé par les firmes pharmaceutiques quand on connaît l'historique des études cliniques qui ont enrichi les évidences en prévention par la correction des lipides et aussi l'évolution en puissance de nos movens thérapeutiques (7).Les cibles des recommandations se sont calquées sur les taux atteints dans ces études. Cette progression dans les études a permis de démontrer qu'il n'existait pas de limite inférieure au-delà de laquelle le bénéfice cardiovasculaire se perdait (« Lowest is **best** »). Autrement dit, la courbe de bénéfice n'est pas une courbe en « J » comme pour la glycémie ou la tension artérielle mais une droite qui reste linéaire même dans les valeurs les plus basses. Ainsi, chez les patients à haut risque, il est recommandé de viser un LDL-C < 55 mg/dL ET au moins une réduction de 50 % par rapport à la ligne de base. Chez certains de ces patients qui présentent un nouvel événement MCVA endéans les deux ans après le premier événement malgré un traitement avec une statine à la dose maximale tolérée, une cible de LDL-C < 40 mg/dL peut même être envisagée.


Y A-T-IL UN DANGER À ABAISSER LE LDL-C À DES VALEURS TRÈS BASSES ?

Certainement pas! La réduction de LDL-C, même à des taux extrêmement bas, par les médicaments ne s'accompagne d'aucun effet secondaire particulier et les médicaments hypolipémiants eux-mêmes, indépendamment de leurs effets sur le cholestérol, ont fait largement la preuve de leur innocuité. Il reste que les statines peuvent occasionner des myalgies chez un petit nombre de patients.

COMMENT PUIS-JE CHOISIR LE MÉDICAMENT LE PLUS APPROPRIÉ POUR ATTEINDRE LA CIBLE LDL-C?

Le taux cible de LDL-C et la réduction que l'on veut atteindre dépendent de la catégorie de risque à laquelle appartient le patient (voir la figure 1). Selon le taux de base (non traité) du LDL-C et la valeur cible à atteindre, on peut estimer quel pourcentage de réduction de LDL-C sera nécessaire. La réduction LDL-C qui peut être réalisée avec une statine dépend du type de statine et de la dose. En règle générale, l'atorvastatine 40 ou 80 mg/j et la rosuvastatine 20 ou 40 mg/j sont considérées comme des statines « puissantes ». La figure 3 décrit la réduction de LDL-C qui peut être obtenue avec divers types de traitement. Ce schéma indique clairement quel traitement permet de réduire d'au moins 50 % en moyenne le LDL-C, réduction actuellement recommandée chez les patients présentant un risque CV élevé ou très élevé. Il faut se rappeler que ce sont des chiffres moyens et qu'il y a une grande variation inter-individuelle dans la réponse de réduction du LDL-C pour une dose donnée d'une statine donnée. Par exemple, un traitement avec rosuvastatine 20 mg/j apportera, en moyenne, une diminution de LDL-C d'environ 50 %, mais cela peut varier d'une personne à l'autre depuis à peine 10 % jusqu'à des extrêmes de 80 %. Il est donc très important d'évaluer le résultat après quelques semaines avec le patient, à la fois en termes d'efficacité et d'innocuité.

FIGURE 3. Réduction moyenne de LDL-C avec différents médicaments



Chez les patients qui ont eu un syndrome coronarien aigu, il sera presque toujours nécessaire d'utiliser une statine de haute intensité pour atteindre les valeurs cibles. Il est donc également recommandé de leur prescrire une statine de haute intensité (sauf contre-indication) dès l'hospitalisation (Figure 3).

RECOMMANDATIONS POUR LE TRAITEMENT DES DYSLIPIDÉMIES CHEZ LES PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS


- Chez les patients plus âgés atteints de MCVA, le traitement des dyslipidémies n'est pas différent de celui des patients plus jeunes atteints de MCVA.
- Pour la prévention primaire des MCVA chez les individus âgés de 75 ans ou moins, le traitement par statines est approprié en fonction du risque global de MCVA.
- Il est recommandé de commencer les statines à faible dose chez les patients souffrant d'insuffisance rénale et/ou lors de l'interaction avec d'autres médicaments. Dans ce contexte, il suffira simplement de commencer avec une dose inférieure et, éventuellement, d'augmenter progressivement.

À QUOI FAUT-IL PENSER EN CAS D'ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX PRÉCOCES DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET/OU D'UN TAUX TRÈS ÉLEVÉ DE LDL-C?

Dans un tel contexte, il faut penser à une hypercholestérolémie familiale mais aussi à la présence dans la famille de taux de Lipoprotéine(a) extrêmement élevés.

L'hypercholestérolémie familiale (HF) est un désordre autosomal dominant responsable d'un déficit de métabolisation des particules LDL qui est caractérisée par l'élévation importante des taux de LDL-C et un risque nettement accru et prématuré de MCVA. La prévalence de l'HF est de 1/300 (environ 40.000 Belges). L'hypercholestérolémie familiale (HF) reste sous-diagnostiquée et sous-traitée dans le monde entier. Le diagnostic clinique peut être confirmé en calculant le score du Dutch Lipid Clinic Network (DLCN) qui prend en compte l'existence d'antécédents personnels ou familiaux de MCVA prématurées, la présence d'un arc cornéen avant 45 ans ou de xanthomes et le taux de LDL-C (1). Une fois identifié, un dépistage approfondi « en cascade » dans la famille est la meilleure approche pour identifier et traiter le plus tôt possible (autour de l'âge de 10 ans).

FIGURE 4. Algorithme de gestion des douleurs musculaires sous traitement par statines.



Les études épidémiologiques et de randomisation mendélienne soutiennent que Lp(a) est causale dans la survenue de maladie cardiaque ischémique (6). Sa concentration (une seule mesure suffit car le taux ne varie pas en cours de vie) est un facteur permettant de nuancer le risque chez les individus à «risque faible» et «modéré». Mais il faut retenir aussi que les personnes qui ont un taux extrêmement élevé de Lp(a) (au-dessus de 180 mg/dL ou de 430 nmol/L) peuvent avoir un risque CV équivalent à celui observé chez les patients atteints d'HF. Le taux de Lp(a) est déterminé par la génétique à hauteur de 90 %.

QUE FAIRE LORSQUE LE PATIENT SE PLAINT DE MYALGIES?

C'est un des effets secondaires le plus souvent mentionné (8). Ces myalgies ne doivent pas être négligées mais elles ne doivent pas non plus être surestimées comme cela est parfois le cas dans les médias ou comme le croient les patients. Dans les études randomisées en double aveugle, les statines ne provoquent que peu souvent plus de douleurs musculaires en comparaison avec le placebo. Par contre, dans les études d'observation où les patients savent la nature du produit qu'ils prennent, 10 % à 15 % des patients se plaignent de faiblesses, de gènes ou de crampes musculaires.

La figure 4 montre l'algorithme des lignes directrices ESC/EAS 2019 concernant la gestion des douleurs musculaires sous traitement aux statines. Le traitement sera interrompu à court ou à long terme, en fonction de la gravité des plaintes, de la localisation de la douleur, du

temps écoulé depuis le début du traitement et du niveau de CK. En fonction de l'évolution ultérieure des plaintes et du taux de CK, un «re-challenge» peut être envisagé avec une faible dose à augmenter progressivement en fonction de la tolérance. En cas d'intolérance complète et de risque CV global important, d'autres médicaments hypolipidémiants doivent être envisagés en monothérapie ou en association. Si l'objectif de LDL-C n'est pas atteint, le risque total de MCVA peut encore être réduit en accordant une attention maximale aux autres facteurs de risque CV (Figure 4).

QUE FAIRE LORSQUE LE PATIENT A DES TAUX ÉLEVÉS DE TRIGLYCÉRIDES ET/OU UN TAUX BAS DE CHOLESTÉROL HDL

Un cholestérol HDL (HDL-C) bas et une augmentation des triglycérides (TG) sont associés à un risque accru de MCVA. Cependant, à ce jour, il n'y a pas suffisamment de preuves qu'une augmentation médicamenteuse du HDL-C ou une réduction par médicaments des TG conduise à moins de MCVA. Les concentrations de HDL-C et TG peuvent donc être utilisées pour estimer le risque total de MCVA mais ne constituent pas un objectif premier de traitement.

Chez les patients avec des TG considérablement augmentés (> 400 mg/dL), le niveau de LDL-C ne peut pas être calculé par la formule de Friedewald. Pour les dyslipidémies à TG élevés et/ou à HDL-C bas, comme on en voit chez les personnes atteintes d'un syndrome métabolique, d'un pré-diabète ou d'un diabète de type II, il est recommandé d'utiliser le Non-HDL-C ou l'ApoB comme

cible thérapeutique. Le Non-HDL-C est facile à calculer par soustraction du HDL-C au taux de cholestérol total. Le Non-HDL-C comprend le taux de cholestérol présent dans toutes les lipoprotéines athérogènes : LDL, Lp(a) et les lipoprotéines riches en TG (9). Ça veut dire que lorsque le taux cible de LDL-C serait atteint sans avoir une réduction suffisante de Non-HDL-C, la valeur des lipoprotéines riches en TG reste augmentée. Malgré un taux de LDL-C idéal, le risque total de MCVA ne sera pas suffisamment diminué. La mesure de l'ApoB est plutôt une estimation directe du taux de LDL dans le sang. Cette méthode est plus précise en cas d'hypertriglycéridémie par rapport au calcul de Friedewald (9). La figure 1 montre les valeurs cibles pour le Non-HDL-C et pour l'ApoB dans les différentes catégories de risque CV total.

Bien que les statines restent le premier choix thérapeutique pour la prévention cardiovasculaire chez les patients souffrant d'hypertriglycéridémie et/ou de HDL-C bas, il est primordial de corriger le mode de vie et l'alimentation (éviter les excès en sucres, féculents, graisses saturées et alcool).

CONCLUSIONS

Les recommandations insistent sur la correction la plus appropriée des taux de LDL-C et Non-HDL-C selon la catégorie de risque du patient. Elles complètent bien sûr ses conseils en répétant l'importance de la correction de tous les facteurs de risque (approche multifactorielle) surtout, comme pour le taux de LDL-C, une correction qui soit la plus optimale possible chez les patients à risque cardiovasculaire « élevé » ou « très élevé ». Cela passe par un meilleur contrôle de la glycémie et/ou de la tension artérielle chez le patient diabétique et/ou hypertendu, un arrêt du tabagisme chez le fumeur et une alimentation plus équilibrée pour tous. L'avantage d'un facteur causal tel que le LDL-C ou Non-HDL-C est que l'abaissement à des taux très faibles s'accompagne toujours d'un bénéfice et n'entraîne aucun effet indésirable contrairement à d'autres facteurs tels que la tension artérielle, ce qui permet donc de pousser sa réduction au maximum de nos possibilités thérapeutiques pour obtenir le plus grand bénéfice chez nos patients à risque élevé ou très élevé.

retenir des recommandations de la Société Européenne de Cardiologie et de la Société Européenne d'Athérosclérose (2019) le traitement des dyslipidémies pour la prévention des maladies cardiovasculaires Que sur le

RÉFÉRENCES

- Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41:111-188.
- Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Lowdensity lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J. 2017. 21; 38: 2459-2472.
- 3. Cholesterol Treatment Trialists, Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010; 376:1670-1681.
- 4. De Bacquer D, De Backer G. Predictive ability of the SCORE Belgium risk chart for cardiovascular mortality. Int J Cardiol. 2010; 143: 385-90.
- Descamps OS, Cooney MT, De Backer G, Graham I. A simple multiplier to calculate the impact of HDL cholesterol on cardiovascular risk estimation using SCORE. Atherosclerosis. 2012; 222: 564-566.

- Nordestgaard BG, Langsted A.Lipoprotein(a) as a cause of cardiovascular disease: insights from epidemiology, genetics, and biology. J Lipid Res. 2016; 57: 1953-75.
- Descamps OS, Verhaegen A, Demeure F,et al. Evolving concepts on the management of dyslipidaemia. Acta Clin Belg. 2020;75(1):80-90.
- Stroes ES, Thompson PD, Corsini A et al. Statin-associated muscle symptoms impact on statin therapy European Atherosclerosis Society Consensus panel statement on assessment, aetiology and management. Eur Heart J. 2015; 36: 1012-1022.
- Langlois MR, Nordestgaard BG, Langsted A et al. Quantifying atherogenic lipoproteins for lipidlowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM.Clin Chem Lab Med. 2020: 58: 496-517.

AFFILIATIONS

- ¹ Department of Internal Medicine, Centres Hospitaliers Jolimont, B-7100 Haine-Saint-Paul and Department of Cardiology, UCLouvain, Cliniques universitaires Saint-Luc, B-1200 Bruxelles, President of the Belgian Atherosclerosis Society
- ² Department of Cardiology, AZ Maria Middelares, B-9000 Gent and Ghent University; Chairman of the Belgian Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
- ³ Clinical and Experimental Endocrinology, Department of Chronic Diseases, Metabolism and Aging (CHROMETA), KU Leuven, B-3000 Leuven
- ⁴ Department of Diabetes, Nutrition and Metabolic diseases, Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman, B-4000 Liège
- ⁵ Department of Laboratory Medicine, Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan, B-8000 Brugge, and national representative of the Royal Belgian Society of Laboratory Medicine
- 6 Department of endocrinology, diabetology and metabolism, Antwerp University Hospital, B-2000 Antwerpen
- ⁷ Department of Cardiology, University Hospital Gent and Gent University, B-9000 Gent
- 8 Department of public health and primary care, Ghent University, B-9000 Ghent

CORRESPONDANCE

Dr. OLIVIER S. DESCAMPS
Department of Internal Medicine
Centres Hospitaliers Jolimont
Rue Ferrer 159
B-7100 Haine-Saint-Paul
olivier.descamps@jolimont.be

La COMBINAISON fait la FORCE



NOUVEAU en B

Rosuvastatine + Ézétimibe

 $40 \, \text{mg}/10 \, \text{mg}$ $20 \, \text{mg}/10 \, \text{mg}$ $10 \, \text{mg}/10 \, \text{mg}$

SANOFI

RCP: Indications thérapeutiques

AIMATION DU MEDICAMENT: Suvezen 10 mg/1 un geomprimes pelicules - Suvezen 20 mg/1 un geomprimes pelicules - Suvezen 40 mg/1 un geomprimes pelicule contient 10 mg/4 or geomprimes pelicule contient 20 mg/4 or geomprimes pelicule 2,4 mg/4 or geomprimes pelicule contient 222,0 mg/4 or geomprimes pelicule contient 20 mg/4 or geomprime pelic tile comprime pellicuce contrient 40b.) mg de lactose monohydrate de fun maximum de 3,3 mg de sodium. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprime pellicuce contrent 40b.) mg de lactose monohydrate de fun diamètre d'environ 9,1 mg : comprimé pelliculé laine per de fun diamètre d'environ 9,9 mm. Suvezen 60 mg/10 mg : comprimé pelliculé jaine per de fun diamètre d'environ 9,9 mm. Suvezen 40 mg/10 mg : comprimé pelliculé sinne per de fun diamètre d'environ 9,9 mm. Suvezen 40 mg/10 mg : comprimé pelliculé sinne per de fun diamètre d'environ 9,9 mm. Suvezen 40 mg/10 mg : comprimé pelliculé sinne per de fun diamètre d'environ 9,9 mm. Suvezen 40 mg/10 mg : comprimé pelliculé sinne per de fun diamètre d'environ 11,1 mm. Suvezen 40 mg/10 mg : comprimé pelliculé sinne per de fun diamètre d'environ 9,9 mm. Suvezen 40 mg/10 mg : comprimé pelliculé sinne per de fun diamètre d'environ 9,9 mm. Suvezen 40 mg/10 mg : comprimé pelliculé sinne per de fun diamètre d'environ 11,1 mm. Suvezen 40 mg/10 mg : comprimé pelliculé sinne per de fun diamètre d'environ 9,9 mm. Suvezen 41,16 € 30 compr. 25,52 € 6,99 € 4,16 € 30 compr. 25,52 €

on de la CPK (≥ 10 x LSM), Aucuri cas de myopathie n'a été signale. Ces essais n'étaient pas adaptés à la comparaison des ététs indésrables rare untristation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de siments et des produits de santé – Division Vigilance – EUROSTATION II – Place Victor Horta 40/40 – B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be dicaments – Villa Louvigny – Allée Marconi – L-2120 Luxembourg – Site internet: http://www.ms.public.lutf/activites/pharmacle-medicament/finde Diegem. NUMÉRO(s) D'AUTORISATION EMISE SUR LE MARCHÉ : Suxezen 10 mg/10 mg compriméticulés : BÉSSig920 - Suivezen 20 n GRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION : 3 février 2019. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : juillet 2019. Date d'appr

Dosage	Boîtes	Prix Public	Hypercholestérolémie primaire Intervention patient (B)		HF Intervention patient (Af)	
			Actif	VIP0	Actif	VIPO
Suvezen 10mg/10mg	30 compr.	25,31 €	6,94 €	4,13 €	0€	
	90 compr.	53,17 €	13,54 €	8,04 €		
Suvezen 20mg/10mg	30 compr.	25,52 €	6,99 €	4,16 €		0 €
	90 compr.	53,17 €	13,54 €	8,04 €		Uŧ
Suvezen 40mg/10mg	30 compr.	25,52 €	6,99 €	4,16 €		
	90 compr	53 17 €	13 54 €	8 04 £		

ant. Les professionnels de sante déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : **Belgique**: Agence fédérale tite internet; www.afmps.be – e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. **Luxembourg**: Direction de la Santé – Division de la Pharmac anmacie-medicament/index.html. **TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**: Sanofi Belgium - Leonardo Da Vincilaan 91539920 - Suvezen 20 mg/10 mg comprimés pellicules - **BE530927** - Suvezen 40 mg/10 mg/10

is atom est order. Surgest peut teur administrat en durinter a de duministrat en duministration en de la consistence a 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN). • Chez les patients présentant une atteinte de la fonction rénale grave (clairance de la créatinine < 30 m/min) • Chez les patients atteints de myopathie • Chez les patients présentant une atteinte de la fonction rénale myopathie/nabdomyolyse. Ces facteurs incluent les suivants : • Atteinte de la fonction rénale modérée (chez les patients présentant des facteurs prédisposant à une myopathie/nabdomyolyse. Ces facteurs incluent les suivants : • Atteinte de la fonction rénale modérée (clairance de la créatinine < 60 m/min) • Chez les patients et la fonction rénale modérée (clairance de la créatinine < 60 m/min) • Chez les patients et la fonction rénale modérée (clairance de la créatinine < 60 m/min) • Chez les patients et la fonction rénale modérée (clairance de la créatinine < 60 m/min) • Chez les patients et la fonction rénale modérée (clairance de la créatinine < 60 m/min) • Chez les patients et la fonction rénale modérée (clairance de la créatinine < 60 m/min) • Chez les patients et la fonction rénale myopathie/nabdomyolyse. Ces facteurs incluent les suivants : • Atteinte de la fonction rénale myopathie/nabdomyolyse. Ces facteurs incluent les suivants : • Atteinte de la fonction rénale myopathie/nabdomyolyse. Ces facteurs incluent les suivants : • Atteinte de la fonction rénale myopathie/nabdomyolyse. Ces facteurs incluent les suivants : • Atteinte de la fonction rénale myopathie/nabdomyolyse. Ces facteurs incluent les suivants : • Atteinte de la fonction rénale myopathie/nabdomyolyse. Ces facteurs incluent les vaux durations de facteurs incluent les vaux durations a la pear et au ussu sous-curante : peu requient : prunter a requencie in et a pear et au ussu sous-curante : peu requent : prunter a requencie in et a pear et au ussu sous-curante : peu requent : prunter a requencie indexermine : syndrome de stevers-curante polyritoripine . / Antections musculaires ; revicalgie de conscipie de representation : peu l'experiment souloureuses - rare : myopathie (dont la myosite) ; riabdomyolyse ; yandrome de type lupus, déchriure musculaire - très rare : hématurie . / Affections des organes de reproduction et du sein : très a médiation immunitaire , affections des tendons, parfois compliquées d'une rupture , myalgie ; myopathie/rhabdomyolyse . / Affections du rein et des voies urinaires : très rare : hématurie . / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : hématurie . / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : hématurie . / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes de reproduction et du sein : très a receive : / Affections des organes : / Affections des organes : receive : / Affections des organes